



Конфиденция

клиника эстетической ортодонтии

Лечение пульпита

Памятка для пациента
(Первичное эндодонтическое лечение)



Пульпит – воспаление внутренней ткани (пульпы) зуба, расположенной в полости зуба и его корневых каналах, вследствие проникновения микроорганизмов из кариозной полости. Чаще всего пульпит является осложнением кариеса зубов.

В процессе лечения врач удаляет пораженную пульпу зуба, механически обрабатывает корневые каналы зуба, создавая нужную для пломбирования форму, промывает обработанные каналы антисептиком с целью борьбы с инфекцией и, наконец, герметично закрывает их специальным пломбировочным материалом. Для обеспечения защиты от попадания дополнительных микроорганизмов из полости рта, зуб изолируют с помощью кофердама (резиновой завесы). Часто эндодонтическое лечение проводится в 2-3 этапа (при большом количестве корневых каналов, наличии каналов сложной формы).

Иногда эндодонтическое лечение требуется при подготовке зубов к протезированию или при некоторых методах пародонтологического лечения (лечения десен). В этом случае удаление пульпы «здорового» зуба является неизбежным ради сохранения здоровья и функции всей полости рта.

Чтобы процесс лечения был комфортным и безболезненным, обязательно используется местная, а иногда и общая анестезия (обезболивание).

Вам проведено первичное эндодонтическое лечение зубов №№ _____.

Для сохранения эффекта проведенного лечения рекомендуем:

• Обязательно восстановить внешнюю (коронковую) часть зуба с помощью пломбы (вкладки, накладки) или искусственной коронки в течение _____.

- Тщательно соблюдать гигиену полости рта в домашних условиях и проходить профессиональную гигиену полости рта в клинике не реже одного раза в 6 месяцев.
- Обратит внимание на рекомендации Вашего лечащего врача по поводу необходимости лечения у стоматологов иного профиля, так как срок службы зуба после эндодонтического лечения зависит и от условий, сложившихся вокруг него (заболевания десен, необходимости в протезировании или исправлении прикуса).
- Не реже одного раза в 6 месяцев проходить бесплатный контрольный осмотр у лечащего врача с возможным рентгенографическим контролем результатов эндодонтического лечения (при наличии показаний).

После проведенного лечения возможен временный дискомфорт, а именно:

- Болезненные ощущения и кровоизлияние в месте вкола иглы при использовании местной анестезии.
- Болезненность, покраснение и отек края десны рядом с вылеченным зубом вследствие необходимого использования кофердама (резиновой завесы) и других приспособлений.
- Небольшая болезненность при накусывании на вылеченный зуб. Вам рекомендуется обратиться к лечащему врачу, если:
- Вышеуказанный временный дискомфорт не проходит в течение двух недель.
- Возникла острая боль после лечения.
- Разрушилась временная пломба в промежутках между этапами эндодонтического лечения или после него.

Дополнительные рекомендации: _____



Конфиденция
КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОРТОДОНТИИ

Улица Чайковского, дом 5/10
телефон: 326-12-09
www.konfidencia.ru