



Конфиденция

клиника эстетической ортодонтии

Операция резекции верхушки корня

Памятка для пациента



Операция резекции верхушки корня зуба проводится в случаях инфекционно-воспалительных процессов в околоверхушечных тканях (киста, гранулема), под местной или общей анестезией по стандартной методике: производится разрез мягких тканей десны, удаляется очаг хронической инфекции вместе с верхушкой корня зуба.

В первые дни после операции появляется отек в оперированной области. Это нормальная реакция организма на хирургическое вмешательство.

При рассечении мягких тканей неизбежно травмируются мелкие кровеносные сосуды, из-за этого могут появиться небольшие кровоизлияния на слизистой оболочке полости рта, в редких случаях на коже.

В полости рта находится большое количество микроорганизмов в зубном налете и остатках пищи. Они могут послужить причиной неблагоприятного течения послеоперационного периода. Поэтому необходимо тщательно соблюдать правила гигиены полости рта.

Рекомендации:

1. Прикладывать к щеке со стороны операции пузырь со льдом для уменьшения отека _____

2. Принимать лекарственные препараты: _____

3. Принимать теплую пищу не ранее, чем через 2 часа после операции, исключая какое либо воздействие на рану.

4. После каждого приема пищи полоскать полость рта раствором антисептика или настоем трав: _____

5. Чистить зубы 2-3 раза в день, начиная со дня операции.

6. В первые 2 дня не спать на той стороне лица, где проводилась операция и не греть ее.

7. В течение 3-х суток после операции избегать тепловых процедур (сауна, горячая ванна) и физических нагрузок.

Дополнительные назначения, рекомендации врача: _____

Невыполнение назначений и рекомендаций врача увеличивает риск возможных осложнений в послеоперационном периоде.

В случае увеличения отека, появления интенсивных болей необходимо обратиться к лечащему врачу .

Контрольный плановый осмотр врача: _____



Улица Чайковского, дом 5/10
телефон: 326-12-09
www.konfidencia.ru